



Рекомендации после хирургических вмешательств

- 1** АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА 500+125 мг по 1 таблетке 3 раза в день 5-7 дней.
- 2** ИБУПРОФЕН 400 мг по 1 таблетке 2-3 раза в сутки.
- 3** ЦЕТИРИЗИН 10 мг по 1 таблетке 1 раза в сутки.
- 4** Ротовые ванночки с раствором ХЛОРГЕКСИДИНА/МИРАМИСТИНА после каждого приёма пищи.
- 5** При вмешательстве на гайморовой пазухе:
а)сосудосуживающие капли в нос (КСИЛОМЕТАЗОЛИН, ОКСИМЕТАЗОЛИН) по 3 капли 3 раза в день 3-4 дня;
б)не сморкаться, не чихать, не кашлять.
- 6** Принимать синбиотики (БИФИДУМБАКТЕРИН) по 1 капсуле 3 раза в день за 20-30 минут до еды 5-7 дней.

Индивидуальные рекомендации:

Ф. И. О. врача _____

С рекомендациями
ознакомлен(а)

Подпись _____ / _____



- 1** Прикладывать снаружи холод после операции по схеме:
а) каждые 2 часа по 10-15 минут в течении 2-х дней;
б) в течение 4-6 часов по схеме: 20 минут - холод, 30 минут - перерыв.
- 2** Первый прием пищи не ранее чем через 2 часа после операции. Щадящая диета (пища мягкая, протёртая, умеренно тёплая, не острая) в течение нескольких дней.
- 3** В течение 2-4 недель не посещать баню, сауну, бассейн, не принимать горячую ванну.
- 4** Строго соблюдать график приёма лекарственных препаратов, назначенных врачом.
- 5** Особо тщательная гигиена полости рта (чистка зубов мягкой щеткой 2 раза в день, полоскание рта дезинфицирующими растворами после каждого приема пищи 3-4 раза в день, если не указано иное).
- 6** В течение 1-2 нед. ограничить физические нагрузки и занятия спортом (бассейн, тренажерный зал и т.д.)

Проведение профессиональной гигиены полости рта:

- 1** Перед вторым этапом имплантации или началом протезирования.
- 2** В течение 1 года после имплантации 1 раз в 3 месяца.
- 3** Далее не реже 1 раза в 6 месяцев.